

Werkwijze

De insectenwerkgroep van KNNV afdeling Gooi werkt samen met geïnteresseerden in nachtvinders van IVN Gooi en omstreken en Vlinder- en Libellenwerkgroep 't Gooi om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de stand van de nachtvinders in het Gooi (Figuur 1). Omdat de menskracht ontoereikend is om de hele regio te monitoren ligt de nadruk op het GNR-werkgebied rondom Zanderij Crailoo (blauwe lijnen in Figuur 2). De werkgroepleden hebben in 2025 vooral gegevens verzameld met vier soorten inventarisaties. De resultaten hiervan zijn samengevoegd met losse meldingen op Waarneming.nl.

Methode 1: Lamp en laken

De werkgroep organiseerde vijf maal een nachtvinderavond op het parkeerterrein van de Infoschuur (4/4; 17/5; 13/6; 4/7; 15/8) onder gunstige weersomstandigheden. Er werden per keer twee lakens opgesteld met aan weerszijde sterke daglichtlampen (ML 160W of 250W) van zonsondergang tot na middernacht. Vlinders die op de lakens neerstreken werden gefotografeerd en aan het eind van de avond op een veilige plaats van het laken afgeschud. Ook heeft de werkgroep twee avonden met twee lakens gemonitord op Landgoed Hoorneboeg (29/6; 19/9) en bij de Uitwatering/Boezemkade van het Naardermeer (30/8). Individueel hebben diverse leden van de werkgroep thuis lakens op andere dagen opgesteld.

Methode 2: Veldwaarnemingen

KNNV hield regelmatig struinmiddagen door de Zanderij waarbij ook waargenomen nachtvinders werden geregistreerd. Meerdere leden onderhielden ook een dagvlindermonitorroute waarbij ze ook dagactieve nachtvinders aan de Vlinderstichting doorgaven. Veel aanvullende veldwaarnemingen zijn van Waarneming.nl afkomstig.

Methode 3: LED-emmers en andere lichtvallen


Als onderdeel van het landelijk meetnet nachtvinders van de Vlinderstichting worden op zeker negen plaatsen van zonsondergang tot zonsopkomst lichtvallen geplaatst, in de praktijk vooral tussen maart en oktober. Nachtvinders die door het UV licht boven deze vallen worden aangetrokken vallen door een trechter tussen eierdozen en komen daar tot rust. 's Ochtends worden alle vlinders geregistreerd en vrijgelaten. Maurits Heldring heeft buiten het landelijk meetnet nachtvinders zes keer een lichtval gebruikt op landgoed Hoorneboeg, en heeft van zijn nachtvinderobservaties daar een apart verslag gemaakt.

Tabel 1: Overzicht van nachtvindermeetpunten van werkgroepleden in het landelijk meetnet van de Vlinderstichting.


Gebied	Tellingen	Licht en val
Hilversum rand Zuiderheide (thuis)	12	LED-emmer
Bussum-Zuid (thuis)	17	LED-emmer
Bussum-Zuid (thuis)	59	2x20W UV-A kist
Aardjesberg	29	LED-emmer
Hilversum-Zuid (thuis)	23	20W UV-A kist
Hilversum-Zuid (thuis)	53	LED-emmer
Hilversum rand Corversbos (thuis)	19	20W UV-A kist
Kalklandje Zanderij Crailo	11	LED-emmer
De Snip	11	LED-emmer
Tussen Natuurbrug en Infoschuur	11	LED-emmer
	245	

Methode 4: Feromoonvallen

Verspreid door het Gooi is met feromoonvallen gemonsterd op de aanwezigheid van wespvlinders; een familie van macronachtvlinders die niet op licht afkomen en vooral 's middags actief zijn. Per keer konden maximaal drie soorten worden gelokt naar een trechterval met een feromoondop gedurende ongeveer een half uur, waarna eventueel gevangen vlinders werden vrijgelaten. Dit gebeurde in de bebouwde kom van Hilversum, Kortenhoef en Nigtevecht, op GNR terreinen Zanderij Crailo, Zuiderheide, Westerheide en Hilversums Wasmeer, en op NM terreinen Laegieskamp, Oppad, Dammerkade en Fort Uitermeer. Resultaten hiervan zijn apart beschreven in de Grote Ratelaar van oktober 2025.



Figuur 1: Overzicht van observatielocaties van de werkgroep in 2025. ★: Lichtvallen. ★: Feromoonvallen. ★: Laken en lamp. — : Gebiedsgrenzen 't Gooi zoals gehanteerd op Gooi.waarneming.nl.



Figuur 2: — : Het “GNR-werkgebied” waar de werkgroep haar inventarisatie en analyse vooral op heeft gericht. Het werkgebied is eigendom van Goois Natuurreservaat en bestaat vooral uit heide en oud gemengd bos op zandgrond. Beeld bewerkt op basis van Waarneming.nl. — : Het aangrenzende gebied in de bebouwde kom van Bussum-Zuid waarvan de observaties zijn meegenomen voor Tabel 3, 4a en 4b.

Weersomstandigheden

Voor de eerste helft van 2025 was bovengemiddeld warm, zonnig en droog. Er is nauwelijks nachtvorst geweest. Voor de rest van het jaar waren er geen grote afwijkingen van het langjarige gemiddelde. Voor de kansen van de nachtvlinders is het weer over het algemeen gunstig geweest, alhoewel de droogte in het voorjaar en zomer de bloei van veel nectarhoudende planten kan hebben beperkt. Waterpartijen met weinig diepgang vielen vaak droog. Eiken en beuken hadden een mastjaar.


De stand van nachtvlinders

Van de 2384 nachtvlindersoorten die voor Nederland gemeld zijn, zijn er 1400 ook aangetroffen in het Gooi. Jaarlijks worden er nog tientallen nieuwe soorten aan de lijsten toegevoegd. De jaarlijkse ontdekking van nieuwe soorten wijst erop dat ons beeld van de verspreiding van de nachtvlinders nog steeds onvolledig is. Dat geldt zeker op lokaal niveau. Tabel 2 en Figuren 3 en 4 laten zien dat het aantal bekende soorten in recente jaren nog nauwelijks afvlakt; noch op het niveau van het werkgebied, noch voor 't Gooi als geheel. Zo'n afvlakking is er voor veel beter zichtbare soortgroepen zoals dagvlinders, libellen en vogels wel. Er is dan ook volop aanleiding om de inspanningen voor het in kaart brengen van de 'lepipfauna' voort te zetten. Grote delen van 't Gooi zijn nog nauwelijks bestudeerd op de aanwezigheid van nachtvlinders. Hieronder vallen vooral de veengronden, inclusief het Naardermeer. Zelf het relatief intensief gemonitorde werkgebied rondom de Zanderij laat nog ieder jaar verrassingen zien. Uitspraken over de ontwikkelingen van het aantal individuen zijn dan ook onmogelijk op lokaal niveau. De algemene soorten waarvan enigszins betrouwbare lokale aantalsontwikkelingen te bepalen zouden zijn (bijvoorbeeld huismoeder en gewone grasmot) zijn niet indicatief voor de habitats van 't Gooi en het werkgebied waarop wordt ingezoomd en deze getalsontwikkelingen zeggen daarom weinig over de waarde van 't Gooi voor nachtvlinders. De Vlinderstichting (2025) is afgelopen jaren wel begonnen met het publiceren van landelijke trends van aantallen nachtvlinders.

Tabel 2: Aantallen waargenomen soorten nachtvinders per gebied en per periode.

Gebied	Totaal (1900-2025#)			Totaal 2025#			Nieuw in 2025#		
	Macro	Micro	Totaal	Macro	Micro	Totaal	Macro	Micro	Totaal
Nederland	881	1503	2384	777	1306	2083	28	22	50
Gooi*	542	858	1400	435	575	1010	10	38	48
GNR-Werkgebied	410	531	941	250	237	487	9	25	34

Noot: Gegevens van waarneming.nl en de KNNV-groep. #: Resultaten t/m 23 november 2025 onder voorbehoud van validatie. Onder de 50 nieuwe waarnemingen voor Nederland bevinden zich zo’n 15 twijfelachtige claims. *: Gebiedsgrenzen zoals in gooi.waarneming.nl.



Figuur 3 en 4: Ontwikkeling in de aantal bekende nachtvinderssoorten per gebied in de afgelopen 25 jaar.

Bijzondere en zeldzame soorten in 2019-2025

Van de soorten die in 2025 in 't Gooi voor het eerst werden waargenomen gelden er 20 als zeldzaam en acht als zeer zeldzaam op landelijk niveau. Om van bijzondere soorten te kunnen beoordelen of ze in het werkgebied stabiel aanwezig zijn en eventueel voortplanten zijn de resultaten van de afgelopen zeven jaar samengevoegd voor het werkgebied (zie Tabel 3, 4a en 4b). Door waarnemingen uit Bussum-Zuid van 2025 in het overzicht op te nemen worden minder soorten die in de buurt van het werkgebied leven gemist. Zekerheid over voortplanting bestaat alleen als er eitjes, rupsen, mijnen of kokers zijn waargenomen, en niet wanneer er uitsluitend imago's zijn gezien. Van de soorten waarvan alleen imago's zijn waargenomen is de geschikte waardplant vrijwel in alle gevallen aanwezig. Met name voor de dikgedrukte soorten lijkt het terrein van GNR een speciale rol te spelen.

Tabel 3: Observaties van zeldzame en beschermde macronachtvlinders in de periode 2019-2025 in het GNR-werkgebied, voor 2025 aangevuld met observaties uit Bussum-Zuid.

Soort	Waardplant	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Niveau	Locatie	Status
Appelglasvlinder	appel, meidoorn	-	-	-	-	-	X	-	Z	WH	B
Heideringelrups	meidoorn, struikheide	E/R	R	E/R	E/R/I	E/R	R	E/R	Z	BH, WH	
Najaarsboomspanner	eik, esdoorn, aak	I	I	-	-	I	I	I	ZZ	BH, WH	EB, RL
Grijsgroene zomervlinder	brem, gaspeldoorn	-	-	-	I	I	I	I	Z	AB, BH	EB, RL
Randstipspanner	bijvoet	I	-	-	I	-	I	-	Z	ZC, FK, SW, SN	B, RL
Late bremspanner	brem, gaspeldoorn, hulst, heide	-	-	-	I	-	-	I	Z	BH, WH, BZ	EB
Streepblokspanner	sint-janskruid	I	-	-	-	-	-	I	Z	ZC	
Wit Spannertje	hazelaar, berk	-	-	-	I	-	-	-	Z	ZC	B, RL
Bosbesbruintje	bosbes	-	-	-	-	I	-	-	Z	AB	
Gevlekte heispanner	dophei, struikhei	-	-	I	*	-	I	I	Z	AB, WH, BH	G, RL
Spaanse vlag	o.a. netels, weegbree, braam	-	-	-	-	-	*	*		BZ	EU
Prachtpurperuiltje	Kogel-, veder-, en wegdistel	-	-	-	-	*	-	-	Z	BZ	NB
Baardsnuituil	eik, berk	-	-	-	I	I	-	I	Z	ZC, SW, FK	KW, RL
Gele snuituil	loofbomen	I	-	-	I	I	I	I	Z	ZC, AB, BH	KW, RL
Klein visstaartje	loofbomen	I	-	-	I	-	-	-	Z	ZC	B, RL
Grijze heide-uil	dophei, struikhei	-	-	*	-	-	-	-	ZZ	BZ	EB
Late heide-uil	dophei, struikhei	-	-	-	-	-	I	I	Z	ZC, AB	G
Gelijnde silene-uil	zeepkruid, silene, varkensgras	-	I	*	*	-	*	-	Z	BH, AB, BZ	B, RL
Moeras-W-uil	moerasvaren, bitterzoet	-	-	-	-	I	I	-	Z	ZC, FK	B, RL
Helmkruidvlinder	helmkruid, melige toorts	R	-	-	R	-	-	R	Z	ZC, FK	B, RL
Kuifvlinder	helmkruid	R	-	-	R	-	-	-	Z	ZC, SW	NB
Vlasbekuiltje	vlasbekje	R	R	R	-	R	*	R	Z	ZC, BZ	B, RL
Heidewitvleugeluil	heide, rolklaver	R	I	R	-	R/I	R/I*	I	Z	BH, WH, ZC, BK	"verdw"
Gele granietuil	munt, kruiskruid, paardenbloem, wilgenroosje	*	I	*	*	*	*	-	ZZ	BK, WH	"verdw"
Gevlamde uil	sint-janskruid	I	I	-	-	-	-	-	Z	ZC, SW	KW, RL
Bont halmuiltje	kortsteel	*	*	-	*	*	-	-	Z	BZ	KW
Sint-janskruiduil	sint-janskruid	-	-	-	-	-	*	*	ZZ	BZ	NB
Florida-uil	o.a. zuring, paardenbloem, roos	-	-	-	-	-	-	*	ZZ	BZ	TV
Katoendaguil	o.a. maïs, tabaksplant, tomaat	-	-	-	-	-	*	I	Z	BZ, ZC	TV

Noot: **Levensfase:** E=Ei, I=Imago, R=Rups, X=Exuviae. **Niveau:** Z=Zeldzaam, ZZ=Zeer Zeldzaam volgens de landelijke normen van Waarneming.nl. **Locatie:** AB=Aardjesberg, BH=Bussumerheide, BK=Bebouwde kom, FK=Franse Kamp, SW=Spanderswoud, WH=Westerheide, ZC=Zanderij Crailoo, SN=Snip, BZ=Bussum-Zuid bebouwde kom, NB=Niet bekend. *: Imago alleen in bebouwde kom grenzend aan het GNR-werkgebied (zie Figuur 2). **Status:** volgens de Voorlopige Rode Lijst Macronachtvlinders van de Vlinderstichting (2013): B=Bedreigd, EB=Ernstig bedreigd, EU=Europees beschermd, G=Gevoelig, KW=Kwetsbaar, RL=Rode lijstsoort, TV=trekvlinder, "verdw"= leek in 2011 verdwenen. Soorten die binnen Nederland (vrijwel) uitsluitend op de Gooise zand/heidegronden voorkomen staan **dik** gedrukt.

Tabel 4a: Observaties van zeldzame micronachtvlinders in de periode 2019-2025 in het GNR-werkgebied, aangevuld met observaties uit Bussum-Zuid.

Soort	Waardplant	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Niveau	Locatie
Grijsrupspurpermot	berk	R	-	-	-	-	-	I	Z	BH, ZC
Ronde berkenblaasmijnmot	berk	M	-	-	-	-	-	-	Z	BH
Grijze lijsterbesmineermot	lijsterbes	-	-	-	-	-	-	M	Z	SW
Witte bastmineermot	eik	-	I	-	-	-	-	-	Z	SW
Berkenzilvervlekmot	berk	-	-	-	M	-	-	-	Z	ZC
Eikenzilvervlekmot	zomereik	-	-	-	-	-	-	M	Z	SW
Dwerglangsprietmot	ereprijs	-	I	-	I	I	I	*	Z	ZC
Berkengalmot	berk	-	-	-	-	-	I	-	Z	ZC
Hoefijzervlekmot	eik, kastanje	M	-	-	M	-	M	-	Z	WH, FK
Okerkleurig kroeskopje	zwammen	-	-	-	-	-	-	I	ZZ	ZC
Azuurblauwmot	sleedoorn, hazelaar, pruim	-	-	-	-	-	*	-	ZZ	BZ
Klerenmot	keratine (wol, haren)	-	-	-	*	*	-	*	Z	BZ
Knopzakdrager	korstmos	-	-	K	-	-	-	K	Z	WH, FK, ZC
Dubbelzakdrager	div. plantresten	K	K	-	-	-	-	K	Z	SW, ZC
Pluimzakdrager	mossen, heide, grassen	-	-	-	-	-	K	-	ZZ	BH
Azaleasteltmot	Indische+Japanse azalea	-	-	-	*	-	-	-	Z	BZ
Grauwe steltmot	liguster,sering, es	-	*	-	*	-	-	M*	Z	BZ
Bleke esdoornsteltmot	gewone esdoorn	-	-	-	-	-	-	*	ZZ	BZ
Gehaakte steltmot	Spaanse aak	-	-	-	-	-	-	I	Z	ZC
Gezaagde eikenvouwmot	eik	I	-	-	-	-	-	-	Z	WH
Bremstengelvouwmot	brem	-	-	-	-	-	I	-	ZZ	WH
Schorspedaalmot	eik, paardenkastanje	-	-	-	-	M	-	-	Z	WH
Panterspitskopmot	wilg, esdoorn, linde	-	I	-	-	I	I	*	Z	SW, ZC, BZ
Gemarmerd koolmotje	damast	-	-	-	*	*	-	-	Z	BZ
Sleedoornhangmatmot	sleedoorn en berk	-	-	-	-	-	*	-	Z	BZ
Lichte zwamboorder	rottend hout	-	I	-	-	-	*	-	Z	ZC, BZ
Schorsvaandeldrager	rottend eik en robinia	-	-	I	-	-	-	-	ZZ	WH
Wit stamgastje	rottend lariks, iep	-	-	-	-	I	-	-	Z	BZ
Spitse kaartmot	brem	-	-	-	-	I	-	I	Z	ZC, BZ, WH
Purperkaartmot	brem	-	-	-	-	-	R	-	Z	WH
Inktmot	struikhei	I	-	-	-	-	-	-	Z	WH
Gepunteerde grasmineermot	div. grassen	I	-	-	I	I	-	-	Z	FK, ZC
Grijze metaalkokermot	rode klaver	*	-	-	-	-	-	-	Z	BZ
Stekelbremkokermot	stekelbrem	R / K	R / K	K	-	-	K	K	Z	WH, BH
Fruitboomkokermot	fruitbomen, lijsterbes	-	-	-	-	-	K	K	Z	WH, ZC
Driekleurige bremkokermot	brem	K	K	K	K	-	K	K	Z	WH, BH
Grote bladkokermot	o.a. berk, meidoorn	K	-	-	-	-	-	-	Z	SW, ZC, FK
Zwaluwtongkokermot	zwaluwtong	-	-	-	-	-	I	-	Z	ZC
Bremkokermot	brem	-	-	-	-	-	I	-	ZZ	WH
Basterdwederikgalmot	basterdwederik	-	-	-	-	-	*	*	Z	BZ
Wegedoorntwijgmot	sporehout, wegedoorn	-	*	-	-	-	-	-	Z	BZ
Gevlekte dikkopmot	hardbloem, havikskruid?	-	*	-	-	-	-	I	Z	WH, BZ
Lichte dikkopmot	ganzenvoet, melde	*	-	*	*	-	-	-	Z	BZ
Schapenzuringdikkopmot	veldzuring, schapenzuring	-	-	I	I	*	R/I	*	Z	BZ, BH, AB
Zwaveldominomot	insectenresten, afval	*	-	-	-	-	-	-	Z	BZ
Fluweelpalpmot	mos	I	I	I	I	I	I	I	Z	ZC, SW
Perzikscheutboorder	appel, prunus, Sp. aak	-	-	-	-	-	-	*	Z	BZ
Bremscheutboorder	brem	I	-	-	-	-	R/I	I	ZZ	WH
Satijnsmalpalpmot	berk	I	I	-	I	-	-	-	Z	ZC, SW
Lichte rietpalpmot	duinriet,kroepaar, kweek	-	-	-	-	-	-	I	Z	ZC
Bremkwastje	brem, gaspeldoorn	R / M	R	M	M	-	R	R/M/I	Z	WH, BH, ZC
Bruine zoompalpmot	gewoon reukgras	I	-	-	-	-	-	I	Z	WH, ZC, BZ
Vroege eikenpalpmot	eik	-	-	-	-	I	-	-	Z	ZC
Stekelbrempalpmot	(rol)klaver	-	-	-	-	-	R	-	ZZ	BH
Brembandpalpmot	brem	-	-	-	-	-	R	R	ZZ	WH
Donkere maanpalpmot	eik, kastanje	-	-	-	I	-	-	-	ZZ	SW

Noot: **Levensfase:** E=Ei, I=Imago, K=Knop of zak, M=Mijn, R=Rups. **Niveau:** Z=Zeldzaam, ZZ=Zeer Zeldzaam volgens de landelijke normen van Waarneming.nl. **Locatie:** AB=Aardjesberg, BH=Bussumerheide, BZ=Bussum-Zuid bebouwde kom, FK=Franse Kamp, SW=Spanderswoud, WH=Westerheide, ZC=Zanderij Crailoo. *: alleen waargenomen in bebouwde kom grenzend aan het GNR-werkgebied (zie Figuur 2).

Tabel 4b: Observaties van zeldzame micronachtvlinders in de periode 2019-2025 in het GNR-werkgebied, aangevuld met observaties uit Bussum-Zuid.

Soort	Waardplant	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Niveau	Locatie
Tomatenmineermot	nachtschade	-		-	-	-	-	-	Z	SW
Diamantborsteltje	berk, iep, wilg	-		-		-	-	*	Z	SW, AB, BZ
Variabele heidebladroller	dophei, struikhei, bosbes	-	-	-	-	-	-		Z	BH
Zuidelijke boogbladroller	wollige sneeuwbal, gelderse roos	-	-	-	-	-	-	*	ZZ	BZ
Klimopbladroller	hedera	-	-	-	-	-	*	*	Z	BZ
Breedlijnige kegelbladroller	fijnspar	*	*	-	-	-	-	-	Z	BZ
Schorssparspiegelmot	grove den	-	*	-	-	-	-	-	Z	BZ
Scherpe spiegelmot	brem, gaspeldoorn		-	-	-	-		-	Z	WH
Esdoornbladroller	esdoorn	*	-	*	-	-	-	-	Z	BZ
Zonnegloedbladroller	Onb.	-	*	-	-	-	-	-	ZZ	BZ
Geelvlakwortelmot	margriet, boerenwormkr.	-	-	*	-	-	-	-	Z	BZ
Scherpe kuifbladroller	kaardenbol, kartelblad, ratelaar, weegbree		-	-	-	-		-	Z	ZC
Tweestreepoogbladroller	fijnspar	-	-	-	-		-	-	Z	ZC
Zalmkleurig knoopvlekje	alsem	-		-	-		-	-	Z	ZC
Schaduwfruitbladroller	eik, wilg, vogelkers	-	-	-					Z	ZC
Dennenappelbladroller	naaldbomen	-	-	-	-	-	-	*	Z	BZ
Strandkruidbladroller	engels gras	-	-	*	-	-	-	-	Z	BZ
Meidoorndwergbladroller	meidoorn	*	-	-	-	-	-	-	ZZ	BZ
Eikendwergbladroller	eik		-	-	-	*	-	-	Z	ZC, BZ
Morgenroodbladroller	esdoorn	-	-		-	-	-	*	Z	ZC, BZ
Luciferbladroller	meidoorn, appel, peer	-	-	-		-	-	-	Z	ZC
Vijgenskeletteermot	vijg	-		-	-			M*	Z	ZC, BZ
Zonnedauwvedermot	zonnedauw	-	-	-		-	-	-	Z	SW
Bliksemlichtmot	hooi, stro, afval	-	-	-	-	-	*	*	Z	BZ
Leervlekmot	ganzenvoet	-	-	-		-	-	*	Z	ZC, BZ
Koolzwammot	berk			-	-				ZZ	ZC, SW
Armbandmot	eik	-	-	-		*	-	-	Z	ZC, BZ
Kraagvleugelmot	kardinaalsmuts		-	-		-	-	*	Z	ZC, SW, BZ
Goudlichtmot	struikheide, ganzerik	-							ZZ	ZC, SW, BH, AB
Scherpe granietmot	mossen	-	-	-		-	-	-	Z	SW
Satijnvlakjesmot	mossen, grassen	-	-	-	-	-		-	Z	WH
Haagbeukmot	haagbeuk, berk	-	-	-		-	-	-	ZZ	SW
Varenhobbit	varens	-	-	-	-	-	-		ZZ	BZ
Mantelmot	riet		-	-	-	-	-	-	Z	ZC

Noot: **Levensfase:** E=Ei, I=Imago, K=Knop of zak, M=Mijn, R=Rups. **Niveau:** Z=Zeldzaam, ZZ=Zeer Zeldzaam volgens de landelijke normen van Waarneming.nl. **Locatie:** AB=Aardjesberg, BH=Bussumerheide, BZ=Bussum-Zuid bebouwde kom, FK=Franse Kamp, SW=Spanderswoud, WH=Westerheide, ZC=Zanderij Crailoo. *: alleen waargenomen in bebouwde kom grenzend aan het GNR-werkgebied (zie Figuur 2).

Beheersmaatregelen

Door de variatie in de waarnemingen van jaar tot jaar zijn lokale negatieve of positieve trends in de nachtvlinderstand moeilijk aan te tonen. Wel is duidelijk dat het werkgebied vooral een grote waarde heeft voor zeldzame soorten die afhankelijk zijn inheemse loofbomen, heide en brem. Het beheer van deze vegetatie lijkt bij GNR naar wens te verlopen (waar de omstandigheden dit toelaten). Voor soorten die voor hun voortplanting afhankelijk zijn van kruidplanten blijft het belangrijk in het maaibeeld genoeg tijd over te laten voor ei en rups om zich te ontwikkelen. Dit vereist terughoudend en cyclisch maaien (zodat kruiden altijd wel ergens kunnen volgroeien) en uitstel van het afvoeren van maaisel tot na de winter.

Referenties

Microvlinders.nl

Vlinderstichting (2013). Voorlopige rode lijst macronachtvlinders. <https://www.vlinderstichting.nl/wat-wij-doen/vlinders-beschermen/nachtvlinders-rode-lijst-voorlopig/>

Vlinderstichting (2025). Vlinderbalans 2025.

<https://www.vlinderstichting.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/vlinderbalans-2025>



Blauw weeskind



Gele granietuil (in copula)



Absintmonnik (rups)



Vlasbekuiltje (rups)



Katoendaguil



Heideringelrups (rups)



Appelglasvlinder



Eikenwespvlinder



Satijnboogbladroller



Heidewitvleugeluil



Leervlekmoet



Koolzwammot



Fruitboomkokermot (koker)



Bremkwastje (mijn)



Najaarsboomspanner



Late Heide-uil